


Serivan™

Pimavanserin

**Presentation**

Serivan™ 17 : Each tablet contains Pimavanserin tartrate INN equivalent to Pimavanserin 17 mg.

Serivan™ 34 : Each capsule contains Pimavanserin tartrate INN equivalent to Pimavanserin 34 mg.

Description

Pimavanserin is an atypical antipsychotic. Pimavanserin acts as an inverse agonist and antagonist at serotonin 5-HT_{2A} receptors.

Indications and uses

Pimavanserin is indicated for the treatment of hallucination and delusion associated with Parkinson's disease psychosis.

Dose and administration

The recommended dose of Pimavanserin is 34 mg, taken orally as two tablets of Serivan 17 mg or one capsule of Serivan 34 once daily, without titration.

Pimavanserin can be taken with or without food.

Pediatric Use: Safety and effectiveness of Pimavanserin have not been established in pediatric patients.

Geriatric Use: No dose adjustment is required for elderly patients.

Use in pregnancy and Lactation

Pregnancy: There is no adequate or well controlled studies in pregnant women.

Lactation: There are no data regarding the presence of this drug in human milk or its effect on milk production.

Side-effects

Pimavanserin may increase mortality in elderly patients with Dementia-Related Psychosis. It may cause QT prolongation.

Precautions

Precautions should be taken in case of hepatic and renal impairment, elderly with dementia related psychosis, pregnancy and lactation condition.

Renal Impaired patients: No dosage adjustment for Pimavanserin is needed in patients with CrCL ≥ 30 mL/min. Use of Pimavanserin is not recommended in patients with CrCL < 30 mL/min.

Hepatic Impaired patients: Use of Pimavanserin is not recommended in patients with hepatic impairment.

Contraindications

Pimavanserin is contraindicated in patients with a history of a hypersensitivity reaction to pimavanserin or any of its components.

Drug Interaction

Co-administration with strong CYP3A4 inhibitors (eg, ketoconazole) increases Pimavanserin exposure. Reduce Pimavanserin dose to 17 mg, taken orally as one tablet once daily. Co-administration with strong CYP3A4 inducers may reduce Pimavanserin exposure. No dose adjustment of carbidopa/levodopa is required when administered concomitantly with pimavanserin.

Storage

Do not store above 30°C. Keep away from light and out of the reach of children.

Commercial Pack

Serivan™ 17: Each box contains 3 blister strips of 10 tablets.

Serivan™ 34: Each box contains 3 blister strips of 6 capsules.

Manufactured by
 Incepta Pharmaceuticals Ltd
 Savar, Dhaka, Bangladesh
 TM Trademark

V.N.02
 SET

সেরিভান™

পিমাভানসেরিন

উপস্থাপনা

সেরিভান™ ১৭: প্রতিটি ট্যাবলেটে রয়েছে পিমাভানসেরিন টারট্রেট আইএনএন যা পিমাভানসেরিন ১৭ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

সেরিভান™ ৩৪: প্রতিটি ক্যাপসুলে রয়েছে পিমাভানসেরিন টারট্রেট আইএনএন যা পিমাভানসেরিন ৩৪ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

বিবরণ

পিমাভানসেরিন একটি এটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক ওষুধ। পিমাভানসেরিনের একটি ৫-এইচটি ২এ রিসেপ্টর এর ইনভার্স এগনিস্ট এবং এন্টাগনিস্ট।

নির্দেশনা ও ব্যবহার

এটি পারকিনসনস ডিজিসের সাথে সম্পর্কিত হ্যালুসিনেশন এবং ডেলুশন এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

মাত্রা এবং সেবনবিধি

প্রস্তাবিত সেবনবিধি টাইট্রেশন ছাড়া ৩৪ মি.গ্রা., এক সাথে সেরিভান ১৭ মি.গ্রা. এর দুটি ট্যাবলেট অথবা সেরিভান ৩৪ মি.গ্রা. এর একটি ক্যাপসুল, দিনে একবার। এটি খাবার সহ বা খাবার ছাড়া সেবন করা যায়।

শিশুদের ক্ষেত্রে: শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত নয়।

বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে: বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে সেবনমাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভবতী ক্ষেত্রে উপযুক্ত কোন পরীক্ষা করা হয়নি।

স্তন্যদান কালে পিমাভানসেরিন মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায় কি না বা দুধ উত্পাদনের উপর তার প্রভাব সংক্রান্ত কোন তথ্য নেই।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

বয়স্ক রোগী যাদের ডিমেনসিয়া জনিত কারণে সাইকোসিস হয়, তাদের ক্ষেত্রে পিমাভানসেরিন গ্রহণে মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। পিমাভানসেরিন কিউটি ওয়েব প্রলম্বিত করে থাকে।

সতর্কতা

যকৃতের এবং কিডনী সমস্যায়, বয়স্ক রোগী যাদের ডিমেনসিয়া কারণে সাইকোসিস হয়েছে, গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদান কালে সতর্ক হওয়া উচিত।

কিডনীর অসমকার্যকারিতায় ব্যবহার: ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স > 30 মি. লি./মিন. হলে সেবনমাত্রা কমানোর প্রয়োজন নেই। ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স < 30 মি.লি./মিন. হলে, পিমাভানসেরিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

যকৃতের অসমকার্যকারিতায় ব্যবহার: যকৃতহানি রোগীদের ক্ষেত্রে পিমাভানসেরিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

প্রতিনির্দেশনা

যারা পিমাভানসেরিন অথবা এর কোনো উপদানের প্রতি সংবেদনশীল তাদের জন্য এই ওষুধ প্রতিনির্দেশিত।

ড্রাগ ইন্টারাকশন

পিমাভানসেরিন এর সাথে সিওয়াইপিথ্রিএফোর ইনহিবিটর (মেমন-কিটোফোনাজল) ব্যবহারে এর কার্যকারিতার প্রভাব বেড়ে যায়। তাই সেবনবিধি কমিয়ে দৈনিক ১৭ মি.গ্রা. এর একটি ট্যাবলেট নেওয়া উচিত। পিমাভানসেরিন এর সাথে সিওয়াইপিথ্রিএফোর ইনহিবিটর ব্যবহারে এর কার্যকারিতার প্রভাব কমে যায়।

পিমাভানসেরিন এর সাথে কার্বিডোপা/লেভডোপা ব্যবহার করলে কার্বিডোপা /লেভডোপা এর সেবনমাত্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

সংরক্ষণ

৩০° সে. এর উপরে সংরক্ষণ করা হতে বিরত থাকুন। আলো থেকে দূরে এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

বাণিজ্যিক মোড়ক

সেরিভান™ ১৭: প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ১০টি ট্যাবলেটের ৩টি ব্লিস্টার স্ট্রিপ।

সেরিভান™ ৩৪: প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ৬টি ক্যাপসুলের ৩টি ব্লিস্টার স্ট্রিপ।

প্রস্তুতকারক
 ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ
 সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
 TM ট্রেডমার্ক