

Clinail™

Amorolfine nail lacquer



Presentation

Clinail™ Nail Lacquer: Each ml contains Amorolfine Hydrochloride INN equivalent to Amorolfine 50 mg.

Description

Amorolfine is a topical antimycotic. It belongs to a new chemical class of Morpholine. Its fungistatic or fungicidal effect is based on an alteration of the fungal cell membrane targeted primarily on sterol biosynthesis. Amorolfine has a broad spectrum of action. Amorolfine is effective against: Yeasts, Dermatophytes, Moulds, Dematiaceae and Dimorphic Fungi.

Indications and Usage

Onychomycosis caused by dermatophytes, yeasts and moulds.

Dosage and Administration

Clinail™ Nail Lacquer should be applied to the affected finger or toe nails once or twice a week as directed by doctor. It is important to use Clinail™ until the infection has cleared and healthy nails have grown back. It usually takes 6 months for fingernails and 9 to 12 months for toenails.

Instructions for use

Step 1: File the nail

First file down the infected areas of nail including the nail surface, as much as possible using the nail file provided. Do not use this nail file on healthy nails, otherwise infection will be spread out. Discard the nail file after use.



Step 2: Clean the nail

Use one of the alcohol pads provided to clean the nail surface. Repeat steps 1 and 2 for each affected nail.



Step 3: Take some lacquer from the bottle

Use nail brush to apply the nail lacquer. The lacquer must not be wiped off the edge of the bottle before it is applied. Do not use the brush on healthy nails and wash the brush with hot water after use.



Step 4: Apply the lacquer

Apply the lacquer evenly over the entire surface of the nail. Repeat these steps for each affected nail. Let the treated nail(s) dry for approximately 3 minutes.



Close the nail lacquer bottle tightly. Dispose the alcohol pad.

- Before using the nail lacquer again, first remove the old lacquer from your nails using a swab, then file down the nails again if necessary.
- Re-apply the lacquer as previously described.
- When dry, the nail lacquer is unaffected by soap and water. So you may wash your hands and feet as normal.

Side-effects

- Rare side-effects (occurring in less than 1 in 1,000 people)- Nail may become discolored, broken or brittle.
- Very rare side-effects (occurring in less than 1 in 10,000 people)- A burning sensation or allergic skin reaction (contact dermatitis).
- Unknown frequency of occurrence-Skin redness, itching hives, blisters and allergic skin reaction (contact dermatitis).

Use in pregnancy

No data available on the use of Amorolfine in pregnant women.

Use in lactation

There is no information on whether Amorolfine passes into human breast milk. There are no data on the use of Amorolfine in lactating women.

Drug interactions

There are no known drug interactions.

Contraindications

Must not be reused by patients who have shown hypersensitivity to the treatment.

Warning and Precautions

- Avoid the lacquer coming into contact with the eyes, ears or mucous membranes (e.g. mouth and nostrils).
- Do not inhale.
- Wear impermeable gloves when using organic solvents to stop the nail lacquer from being removed.

Over dosage

No information is available concerning over dosage in human.

Storage

Do not store above 30 °C. Protect Clinail™ lacquer from heat. Keep the bottle tightly closed.

Commercial Pack

Clinail™ nail lacquer: Each box contains 1 bottle of 3ml nail lacquer, 16 alcohol pad & 8 nail files.

Manufactured by
 **Incepta Pharmaceuticals Ltd**
 Dhamrai Unit, Dhaka, Bangladesh
 TM Trademark

CNN

V.N.01

ক্লিনেইল™

এমোরলফিন নেইল ল্যাকার

উপস্থাপনা

ক্লিনেইল™ নেইল ল্যাকার: প্রতি ১ মি. লি. তে রয়েছে এমোরলফিন হাইড্রোক্লোরাইড আই এনএন যা ৫০ মি. গ্রা. এমোরলফিনের সমতুল্য।

বিবরণ

এমোরলফিন একটি টপিক্যালী ব্যবহার উপযোগী ছত্রাকরোধী ঔষধ। এটি একটি নতুন কেমিক্যাল শ্রেণী মরফোলিন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। এমোরলফিন ছত্রাকের কোষপ্রাচীরের স্টেরল বায়োসিন্থেসিস এ প্রভাব ফেলার মাধ্যমে ছত্রাকের কোষপ্রাচীরের পরিবর্তন ঘটায়। এভাবে এটি ছত্রাকরোধী অথবা ছত্রাক নাশক কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। এমোরলফিন বিস্তৃত প্রজাতির ছত্রাকের বিরুদ্ধে কার্যকর। এমোরলফিন বিভিন্ন স্ট্রুট, ডারমাটোফাইট, মোউল্ডস, ডারমাটোসিয়ে এবং ডাইমরফিক ছত্রাকের বিরুদ্ধে কার্যকর।

নির্দেশনা এবং ব্যবহার

ডারমাটোফাইট, স্ট্রুট এবং মোউল্ডস দ্বারা সংক্রমিত অনিকোমাইকোসিস এর জন্য এটি নির্দেশিত।


মাত্রা এবং ব্যবহারবিধি

ক্লিনেইল™ অনিকোমাইকোসিসে আক্রান্ত হাতের নখ অথবা পায়ের নখে সপ্তাহে একবার অথবা দুইবার লাগাতে হবে অথবা চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। সংক্রমণ সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়া এবং নতুন নখ বেড়ে ওঠা পর্যন্ত ক্লিনেইল™ ব্যবহার করে যেতে হবে। সংক্রমণ নিরাময় হতে সাধারণত হাতের নখের জন্য ৬ মাস এবং পায়ের নখের জন্য ৯ থেকে ১২ মাস সময় লেগে থাকে।

ব্যবহারবিধি

ধাপ ১: নেইল ফাইল দিয়ে নখ ঘষুন

প্যাকেটে প্রদত্ত নেইল ফাইল দিয়ে নখের সংক্রমিত জায়গাসহ নখের উপরিতল ঘষুন। সুস্থ নখে ব্যবহারকৃত ফাইল ব্যবহার করা নিষেধ নতুবা সুস্থ নখ সংক্রমিত হতে পারে। ব্যবহারের পর নেইল ফাইলটি ফেলে দিন।




ধাপ ২: নখটি পরিষ্কার করুন

প্যাকেটে প্রদত্ত এলকোহল প্যাড দিয়ে নখ পরিষ্কার করুন। প্রতিটি সংক্রমিত নখের জন্য ধাপ ১ এবং ধাপ ২ অনুসরণ করুন।



ধাপ ৩: বোতল থেকে নেইল ল্যাকার নিন

নেইল ল্যাকার প্রয়োগ করার জন্য বোতলে প্রদত্ত নেইল ব্রাশ ব্যবহার করুন। নেইল ল্যাকার ব্যবহারের পূর্বে বোতলের প্রান্তে ব্রাশটি মোছা যাবে না। ব্রাশটি সুস্থ নখে ব্যবহার করা যাবে না। নেইল ব্রাশটি গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পুনরায় বোতলে রাখতে হবে।



ধাপ ৪: নেইল ল্যাকার প্রয়োগ করুন

নেইল ল্যাকার নখের উপরিতলে সমভাবে প্রয়োগ করুন। প্রতিটি সংক্রমিত নখের জন্য এই ধাপটি পুনরায় অনুসরণ করুন। ব্যবহারের পর নখটি কে শুকানোর জন্য ৩ মিনিট সময় দিন। নেইল ল্যাকারের বোতলটি শক্ত করে বন্ধ করুন। এলকোহল প্যাডটি ফেলে দিন।



- নেইল ল্যাকার পুনরায় ব্যবহারের পূর্বে, এলকোহল প্যাড ব্যবহার করে পুরোনো নেইল ল্যাকার পরিষ্কার করে নিন, প্রয়োজনে নখ পুনরায় ঘষুন।
- পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী নেইল ল্যাকার ব্যবহার করুন।
- শুষ্ক অবস্থায় ক্লিনেইল সাবান এবং পানি দ্বারা ধুয়ে যায় না। তাই ব্যবহারের পর হাত এবং পা সাধারণভাবে পরিষ্কার করা যাবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

- বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (১০০০ এর মধ্যে ১ জনের ও কম জনসাধারণের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে): নখের রং পরিবর্তিত হতে পারে, নখ ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে।
- খুবই বিরল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (১০০০০ এর মধ্যে ১ জনের ও কম জনসাধারণের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে): জ্বালাপোড়া অথবা ত্বকে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে (কন্সট্যাঙ্ক ডারমাটাইটিস)।
- অজ্ঞাত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: লালচে ভাব, চুলকানি, ফোকা এবং অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। (কন্সট্যাঙ্ক ডারমাটাইটিস)

গর্ভাবস্থায় ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় এমোরলফিন এর নিরাপদ ব্যবহারের উপযোগী তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

স্তন্যদানকালে ব্যবহার

এমোরলফিন মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা তা জানা যায়নি। স্তন্যদানকালে এমোরলফিন ব্যবহারের উপযোগী তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

ড্রাগ ইন্টার্যাকশন

ড্রাগ ইন্টার্যাকশন সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রতিনির্দেশনা

অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে পুনরায় ব্যবহার প্রতি নির্দেশিত।

সতর্কতা

- চোখ, কান ও মিউকাস মেমব্রেনের (যেমন: মুখ এবং নাক) সংস্পর্শ নেইল ল্যাকার যেন না আসে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- শ্বাসনালীর মাধ্যমে ঔষুধটি প্রয়োগ করা যাবে না।
- জেব ট্রাবক ব্যবহারের সময় হাতে অডেন্ডা গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে যেন নেইল ল্যাকার ধুয়ে না যায়।

মাত্রাধিক্য


মানবদেহে অধিক মাত্রায় ব্যবহারের কোন তথ্য নেই।

সংরক্ষণ

৩০ °সে. এর উপরে সংরক্ষণ করা হতে বিরত থাকুন। উচ্চ তাপ এর সংস্পর্শ থেকে ক্লিনেইল™ নেইল ল্যাকারকে দূরে রাখুন। বোতল শক্তভাবে বন্ধ রাখুন।

বাণিজ্যিক মোড়ক

ক্লিনেইল™ নেইল ল্যাকার: প্রতিটি বক্সে রয়েছে ৩ মি.লি. নেইল ল্যাকারের ১টি বোতল, ১৬টি এলকোহল প্যাড এবং ৮টি নেইল ফাইলস।

প্রস্তুতকারক
 **ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ**
 ধামরাই ইউনিট, ঢাকা, বাংলাদেশ
 TM ট্রেডমার্ক