

W=110 mm, H= 200 mm

**Ezymilk™ Paediatric Drops**  
Lactase



#### Presentation

Ezymilk™ Paediatric Drops: Each ml drop contains Lactase USP 0.11g equivalent to 3333.33 units.

#### Description

Lactase is an enzyme that helps to prevent symptoms of lactose intolerance. It breaks down the lactose (milk sugar) to produce glucose and galactose via hydrolysis and making dairy food easier to digest.

#### Indications and usage

Prevention of symptoms of lactose intolerance in infants

- Infantile colic
- Abdominal pain
- Bloating
- Flatulence
- Diarrhea
- Borborygmi

#### Dosage & administration

Add lactase enzyme to breast milk or formula in the following directions

#### Breast Milk:

- Express a few tablespoons (2-3 tablespoons) of breast milk into sterilized container
- Add 4 drops of lactase paediatric drops
- Give mixture to infant on a spoon or oral syringe before initiating breastfeeding
- Breast feed as normal

#### Formula:

- Add 4 drops of lactase paediatric drops to warm (not hot) formula
- Wait 30 minutes, shaking formula occasionally

#### Making formula in advance:

- Add 2 drops of lactase paediatric drops to warm formula
- Store in refrigerator for minimum 4 hours
- Feed Infant as normal
- Use within 12 hour
- Discard any unused formula

#### Precautions

The milk should be warm and close to body temperature but not too hot or too cold. Do not boil milk with lactase drops already mixed in with milk.

#### Contraindications

This drug is contraindicated in patients with known hypersensitivity to lactase or any other components of the product.

#### Over dosage

Over dose of Lactase paediatric drops may cause loose motion.

#### Drug interaction

No information for lactase interactions has been found yet.

#### Side-effects

There are no major side effects reported. Very few side-effects may include rash, difficulty in thinking, tightness in chest etc.

#### Storage

Do not store above 30°C. Keep away from light and out of the reach of children. After opening the cap of the Lactase Paediatric Drops, it must be stored into the refrigerator and after 6 weeks it cannot be used.

#### Commercial Pack

Ezymilk™ Paediatric Drops: Containing 15 ml paediatric drops and a calibrated dropper.

Manufactured by  
**Incepta Pharmaceuticals Ltd**  
Savar, Dhaka, Bangladesh  
™ Trademark

V.N.01

**ইজিমিল্ক™** পেডিয়াট্রিক ড্রপস  
ল্যাকটেজ

#### উপস্থাপন

ইজিমিল্ক™ পেডিয়াট্রিক ড্রপস: প্রতি মি লি ড্রপে রয়েছে ল্যাকটেজ ইউএসপি ০.১১ গ্রাম বা ৩৩৩৩.৩৩ ইউনিট এর সমতুল্য।

#### বিবরণ

ল্যাকটেজ এক প্রকারের এনজাইম যা ল্যাকটোজ ইনটোলারেন্স এর লক্ষণসমূহ প্রতিরোধে সহায়তা করে। ইহা ল্যাকটোজকে হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ উৎপন্ন করে এবং দুগ্ধজাত খাবার সহজে পরিপাক করে থাকে।

#### নির্দেশনা ও ব্যবহার

বাচ্চাদের ল্যাকটেজ ইনটোলারেন্স এর লক্ষণসমূহ প্রতিরোধে-

- ইনফ্যান্টাইল কোলিক
- পেটে ব্যথা
- পেট ফোলা
- পেট ফাপা
- ডায়রিয়া
- বরবরিগমি

#### মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

ল্যাকটেজ এনজাইম মাতৃদুগ্ধে অথবা ফরমুলাতে যোগ করার নির্দেশনাসমূহ-

#### মাতৃদুগ্ধে:

- জীবানুমুক্ত পাত্রে কয়েক টেবিল চামচ (২-৩ টেবিল চামচ) মাতৃদুগ্ধ নিতে হবে
- ৪ ড্রপস ল্যাকটেজ পেডিয়াট্রিক ড্রপস যোগ করতে হবে
- মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানোর পূর্বে এই দ্রব্য শিশুকে চামচ অথবা ওরাল সিরিন্জ দিয়ে খাওয়াতে হবে
- সাধারণভাবে মাতৃদুগ্ধ খাওয়াতে হবে

#### ফর্মুলা:

- ৪ ড্রপস ল্যাকটেজ পেডিয়াট্রিক ড্রপস কুসুম গরম (অতিরিক্ত নয়) ফরমুলাতে যোগ করতে হবে
- ৩০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, এবং মাঝে মাঝে বাকাকাতে হবে

#### পূর্বেই ফরমুলা তৈরি:

- ২ ড্রপস ল্যাকটেজ পেডিয়াট্রিক ড্রপস কুসুম গরম ফরমুলাতে যোগ করতে হবে
- কমপক্ষে ৪ ঘন্টা রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে হবে
- সাধারণভাবে খাওয়াতে হবে
- তৈরি করার ১২ ঘন্টার মধ্যেই ব্যবহার করতে হবে
- অব্যবহৃত ফরমুলা ফেলে দিতে হবে

#### সতর্কতাসমূহ:

দুগ্ধ কুসুম গরম এবং শারিরিক তাপমাত্রার কাছাকাছি হতে হবে কিন্তু খুব গরম অথবা খুবঠান্ডা হওয়া উচিত নয়। যে দুগ্ধে ল্যাকটেজ প্যাডিয়াট্রিক ড্রপস মিশ্রিত আছে তা ফুটানো যাবে না।

#### প্রতিনির্দেশনাসমূহ

এই ওষুধ ল্যাকটেজ অথবা ল্যাকটেজ পেডিয়াট্রিক ড্রপের কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

#### অতিমাত্রা

ল্যাকটেজের অতিরিক্ত ব্যবহারে পাতলা পায়খানা হতে পারে।

#### ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

এখনও ল্যাকটেজের প্রতিক্রিয়ার কোন উপাত্ত পাওয়া যায় নাই।

#### পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহ

ল্যাকটেজের মুখ্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহ দেখা যায় নাই। সামান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহ যেমন ফুসকুড়ি, চিন্তায় বিঘ্ন, বৃকে চাপ অনুভব করা ইত্যাদি হতে পারে।

#### সংরক্ষণ

৩০ ° সে. এর উপরে সংরক্ষণ করা হতে বিরত থাকুন। আলো থেকে দূরে এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। ড্রপের ছিপি খোলার পর রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ৬ সপ্তাহ পর ব্যবহার করা যাবে না।

#### বানিজ্যিক মোড়ক

ইজিমিল্ক™ পেডিয়াট্রিক ড্রপস: প্রতিটি ডপে রয়েছে ১৫ মি.লি. ল্যাকটেজ পেডিয়াট্রিক ড্রপস এবং মাপ নির্দেশিত ড্রপার।

প্রস্তুতকারক  
**Incepta** ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ  
সভার, ঢাকা, বাংলাদেশ  
TM ট্রেডমার্ক