

Leaflet Reference Product: XXXX

Size: L=220, W= 110

Change to: Size / Text / Design / Logo ✓

Font Details:

Brand Name: English (Regular, Italic, Bold) : Arial (Regular)




Generic Name: English (Regular, Italic, Bold) : Arial (Regular)

Brand Name: Bangla (Regular, Italic, Bold) : SutonyMJ (Regular)

Generic Name: Bangla (Regular, Italic, Bold) : SutonyMJ (Regular)

Work Date: 10-02-22; Output Date: 19-09-22; Printers Name: 000
DTP-9

Size: L=220, W= 110

<p style="text-align: center;">III</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 60%;"><h2>Obscare™ Cream</h2><p>Chlorhexidine Gluconate</p></div><div style="width: 30%; text-align: center;"><p>2171</p></div></div> <p>Presentation Obscare™ Cream: Contains Chlorhexidine Gluconate solution BP 5% v/w (equivalent to Chlorhexidine Gluconate 1% w/w).</p> <p>Pharmacology Chlorhexidine has a wide range of antimicrobial activity. Chlorhexidine is effective against a wide range of Gram negative and Gram positive vegetative bacteria, yeasts, dermatophyte fungi and lipophilic viruses.</p> <p>Indications and uses It is used as an antiseptic cream and lubricant by healthcare professionals when examining women during pregnancy or for gynaecological problems.</p> <p>Dosage and administration For use on the skin or vagina only. Some of the product should be spread onto the gloved hand of doctor, midwife or examiner and some should be applied around the birth canal and to the skin around the perineum of the patient. Shake the bottle well before each use.</p> <p>Contraindications Obscare Cream is contraindicated in patients who are hypersensitive to Chlorhexidine or to any of the excipients of this formulation.</p> <p>Side effects Some irritation of the skin or allergic (itchy) reactions may occur when it is first applied. Allergic reactions like sudden wheeziness, difficulty in breathing, swelling of the eyelids, face or lips, rash or itching may occur.</p> <p>Warning and Precautions Avoid application to the ears and eyes, and any deep cuts involving the head or spine. Washing out with water may be required if necessary. Avoid contact with the brain and meninges.</p> <p>Use in Pregnancy & Lactation Chlorhexidine Gluconate obstetric cream is safe during pregnancy and lactation.</p> <p>Anyone should consult with doctor for advice before taking any medicine when she is pregnant, thinks that she may be pregnant, is planning to become pregnant, or is breast-feeding.</p> <p>Drug interactions If the drug is mixed with soap or detergents, its effectiveness may be reduced. Chlorhexidine is incompatible with soap and other anionic agents.</p> <p>Overdosage If the product is swallowed, it should be treated symptomatically and with gastric lavage using milk, raw egg, gelatin or mild soap.</p> <p>Storage condition Do not store above 30 °C. Keep away from light & out of the reach of children.</p> <p>Commercial Pack Obscare™ Cream: Each HDPE bottle contains 60 ml cream.</p> <p style="text-align: right;">Manufactured by  Incepta Pharmaceuticals Ltd Dhamrai Unit, Dhaka, Bangladesh ™ Trademark</p> <p style="text-align: right;">OBS V.N.01</p>	<h2>অবস্কেয়ার™ ক্রিম</h2> <p>ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনোট</p> <p>উপস্থাপন অবস্কেয়ার™ ক্রিম: এতে রয়েছে ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনোট সলিউশন বিপি ৫% ভি/ডব্লিউ (যা ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনোট ১% ডব্লিউ/ডব্লিউ এর সমতুল্য)।</p> <p>ফার্মাকোলজি ক্লোরহেক্সিডিন এর বিস্তৃত পরিসীমার জীবাণুনাশক কার্যকারিতা রয়েছে। এটি বিস্তৃত পরিসীমার গ্রাম-নেগেটিভ এবং গ্রাম-পজিটিভ ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, ডার্মাটোফাইট ছত্রাক এবং লিপোফিলিক ভাইরাস এর বিরুদ্ধে কার্যকর।</p> <p>নির্দেশনা ও ব্যবহার ওষুধটি গর্ভাবস্থায় অথবা স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম কিংবা লুব্রিকেন্ট হিসেবে স্বাস্থ্যকর্মীগণ ব্যবহার করেন।</p> <p>মাত্রা এবং ব্যবহারবিধি কেবলমাত্র ত্বক বা যোনীতে ব্যবহারের জন্য। ডাক্তার, মিডওয়াইফ অথবা পরীক্ষকের গ্লাভস পরিহিত হাতে ওষুধটির কিছু পরিমাণ মাথা উচিত এবং কিছু পরিমাণ যোনীপথের ত্বক এবং পেরিনিয়ামের ত্বকে প্রয়োগ করা উচিত। প্রতিবার ব্যবহারের পূর্বে বোতল ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিন।</p> <p>প্রতিনির্দেশনা অবস্কেয়ার ক্রিম তাদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত যাদের ক্লোরহেক্সিডিন অথবা ওষুধটির কোনো একটি উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা রয়েছে।</p> <p>পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া প্রথমবার প্রয়োগের পর ত্বকে সামান্য জ্বালাপোড়া বা চুলকানি দেখা যেতে পারে। এলার্জিক প্রতিক্রিয়া যেমন, আকস্মিক ছইজিনেস, শ্বাস নিতে অসুবিধা, চোখের পাতা, মুখমণ্ডল বা গ্রেট ফুলে যাওয়া, র্যাশ বা চুলকানির তথ্য পাওয়া গিয়েছে।</p> <p>সতর্কতা কান এবং চোখে প্রয়োগ, মাথা বা মেরুদণ্ড সহ যেকোনো গভীর কাটায় প্রয়োগ এড়িয়ে চলুন। অসাবধানতাবশত প্রয়োগের ক্ষেত্রে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত। মস্তিষ্ক ও মেনিঞ্জিস এর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।</p> <p>গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনোট অবস্কেয়ার ক্রিমের ব্যবহার নিরাপদ। কেউ যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে, সন্তান গর্ভবতী হয় অথবা সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করে থাকে কিংবা স্তন্যদানকারী হয়, তাদের যেকোন ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত।</p> <p>ওষুধ আন্তঃক্রিয়া ওষুধটি সাবান বা ডিটারজেন্টের সাথে মিশানো হলে কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। সাবান এবং অন্যান্য অ্যানায়োনিক এজেন্টের সাথে ওষুধটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ।</p> <p>মাত্রাধিক্য কেউ ওষুধটি গিলে ফেললে লক্ষণগুলোর চিকিৎসা করা উচিত এবং দুধ, কাঁচা ডিম, জিলাটিন বা মৃদু সাবান ব্যবহার করে গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা উচিত।</p> <p>সংরক্ষণ ৩০ °সে. এর উপরে সংরক্ষণ করা হতে বিরত থাকুন। আলো থেকে দূরে এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।</p> <p>বাণিজ্যিক মোড়ক অবস্কেয়ার™ ক্রিম: প্রতিটি এইচডিপিই বোতলে রয়েছে ৬০ মি.লি. ক্রিম।</p> <p style="text-align: right;">প্রস্তুতকারক  ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ ধামরাই ইউনিট, ঢাকা, বাংলাদেশ ™ ট্রেডমার্ক</p>
--	---