Ш

# 30 mm

**Kytido**<sup>Th</sup> Itopride Hydrochloride Tablet



### Presentation

Kytido<sup>™</sup> tablet: Each film coated tablet contains Itopride Hydrochloride INN 50 mg

Itopride is an acetylcholinesterase inhibitor and dopamine (D2) receptor antagonist used to treat symptoms of functional dyspepsia such as nausea and vomiting

### 30 mm Indications

Gastrointestinal symptoms such as-

- · Functional dyspepsia
- · Non-ulcer dyspepsia
- · Postprandial fullness
- · Nausea and vomiting
- Hearthurn
- Upper abdominal pain or discomfort

### Dosage and administration:

The adult oral dosage of Itopride Hydrochloride is 150 mg daily in three divided doses before meals. The dose may be reduced according to patients age and symptoms

### Contraindications

Itopride Hydrochloride is contraindicated in-

- · Patients with known hypersensitivity to Itopride Hydrochloride or any of the excipients of the
- · In conditions when increased gastrointestinal motility may be harmful e.g., gastrointestinal hemorrhage, mechanical obstruction or perforation.

Itopride Hydrochloride should be used in caution as it enhances the action of acetylcholine. Also, caution should be taken for those who are suffering from Parkinson disease or other conditions involving dopamine regulation issues. Itopride Hydrochloride may make you feel dizzy, thus you should be cautious while driving. Itopride Hydrochloride should not be used aimlessly for a long term when no improvement of gastrointestinal symptoms is observed.

## Side effects

Potential side effects of Itopride Hydrochloride includes-

- Blood and lymphatic system disorder: Leukopenia and thrombocytopenia
- Immune system disorder: Anaphylactoid reaction
- Endocrine disorder: Increased prolactin level and gynecomastia
- · Nervous system disorder: Dizziness, headache and tremor
- Gastrointestinal disorders: Diarrhoea, constipation, abdominal pain, increased saliva and nausea
- · Skin and subcutaneous tissue disorders: Rash, redness and itching

# Use in pregnancy and lactation:

Pregnant women: The safety of Itopride Hydrochloride in pregnant women has not been

Lactating mother: Use of this medicine in breastfeeding mothers is not recommended. If the need of this medicine is absolutely necessary then breastfeeding should be discontinued prior to uptake.

# **Drug** interactions

Itopride Hydrochloride has gastrokinetic action. So, it could influence the absorption of concomitantly orally administered drugs. Particularly caution should be taken with drugs with a narrow therapeutic index, sustained release or enteric coated formulations. Concomitant administration with anti-cholinergic drugs e.g. Tiquizium bromide, Scopolamine butyl bromide, Timepidium bromide etc. may reduce the action of Itopride Hydrochloride.

## Overdosage

There have been no reported cases of overdose in human. In case of excessive overdose, the usual measures of gastric lavage and symptomatic therapy should be applied.

## Storage condition

Do not store above 30 °C. Keep away from light and out of the reach of children.

# Commercial pack

Kytido<sup>™</sup> Tablet: Each box contains 5 blister strips of 10 tablets.

Manufactured by



™ Trademark

V.N.01 KYT



কাইটিডো<sup>™</sup> ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্লোরাইড আইএনএন ৫০ মি.গ্রা.।

ইটোপ্রাইড একটি আসিটাইলকোলিন এস্টারেজ ইনহিবিটর এবং ডোপামিন (ডি২) রিসেপ্টর প্রতিবন্ধক যা ফাংশনাল ডিসপেপসিয়ার সমস্যা (যেমনঃ বমি এবং বমি বমি ভাব) এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্লোরাইড নিম্নোক্ত গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল উপসর্গে নির্দেশিত। যেমনঃ

- ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া
- নন-আলসার ডিসপেপসিয়া
- খাওয়ার পর পাকস্থলীর পূর্ণতা
- বমি বমি ভাব এবং বমি
- বক জালাপোডা
- পেটের উপরের অংশে ব্যথা বা অস্বস্তি

প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্লোরাইড দৈনিক ১৫০ মি.গ্রা. তিনটি বিভক্ত ভোজে খাবারের আগে খেতে হবে। রোগীর বয়স এবং লক্ষণ অনুযায়ী ডোজ্ব্রাস করা যেতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্রোরাইড ব্যবহার করা উচিত নয়।

ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্রোরাইড বা এর কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা আছে এমন রোগীদের জন্য প্রতিনির্দেশিত। গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল গতিশীলতা বন্ধিজনিত সমস্যা (যেমন: গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল রক্তক্ষরণ, যান্ত্রিক বাধা বা ছিদ্র) এমন রোগীদের জন্য প্রতিনির্দেশিত ৷

ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্লোরাইড সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। কারণ এটি অ্যাসিটাইলকোলিনের ক্রিয়া বাড়ায়। এছাড়াও, যারা পার্রুকিনসন রোগে ভুগছেন বা ডোপামিন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত তাদের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। **ইটোপ্রাইড** হাইডোক্সোরাইড সেবন করলে মাথা ঘোরা বোধ হতে পারে. তাই গাডি চালানোর সময় আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল উপসর্গের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত না হলে ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্লোরাইড দীর্ঘমেয়াদে উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

# পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া

ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্লোরাইড এর সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসমূহ হলো-

- রক্ত এবং লিমফ্যাটিক সিস্টেম জনিত রোগ: লিউকোপেনিয়া এবং প্রম্বোসাইটোপেনিয়া
- ইমিউন সিস্টেম জনিত রোগ: অ্যানাফাইল্যাকটয়েড রিয়েকশন
- এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার: প্রোল্যাক্টিনের মাত্রা বন্ধি এবং গাইনোকোমাস্টিয়া
- সায়তন্ত্রের রোগ: মাথা ঘোরা এবং টেমর
- গ্যান্ট্রোইনটেস্টাইনাল ডিসঅর্ডার: ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ব্যথা, লালা বন্ধি এবং বমি বমি ভাব
- তুক এবং সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুর রোগ: ফুসকুড়ি, লালচে ভাব এবং চুলকানি
- হেপাটোবিলিয়ারি ডিসঅর্ডার: জন্ডিস

# গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভবতী মহিলা: গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্লোরাইড এর নিরাপত্তা প্রমাণিত না হওয়ায় নির্দেশিত নয়। স্তন্যদানকারী মা: বুকের দুধ খাওয়ানো মায়েদের জন্য এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি এই ওয়ুধের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই প্রয়োজন হয় তবে গ্রহণের আগে বকের দধ খাওয়ানো বন্ধ করতে হবে।

# ডাগ ইন্টার্যাকশন

ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্লোরাইড এর গ্যাস্ট্রোকাইনেটিক ক্রিয়া রয়েছে। সুতরাং, এটি ওরালি নেওয়া অন্যান্য ওয়ুধের শোষণকে প্রভাবিত করতে পারে। ন্যারো থেরাপিউটিক ইনডেপ্সের ওযুধ, সাসটেইভ রিলিজ ফর্মুলা বা এন্টেরিক কোটেড ফর্মুলেশন বিশিষ্ট ওযুধের সাথে গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অ্যান্টি-কোলিনার্জিক ওযুধ (যেমনঃ টিকুইজিয়াম ব্রোমাইড, কোপোলামিন বিউটাইল ব্রোমাইড, টিমেপিডিয়াম ব্রোমাইড ইত্যাদি) এর সাথে গ্রহণ করলে ইটোপ্রাইড হাইড্রোক্রোরাইড এর ক্রিয়া কমতে পারে।

মাত্রাধিক্যের কোন রিপোর্ট নেই। অতিরিক্ত মাত্রার ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিক ল্যান্ডেজ এবং লক্ষণীয় থেরাপির স্বাভাবিক ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করতে

৩০°সে. এর উপরে সংরক্ষণ করা হতে বিরত থাকুন। আলো থেকে দূরে এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

# বাণিজ্যিক প্যাক

কাইটিডো<sup>™</sup> ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সেরয়েছে ১০টি ট্যাবলেটের ৫টি ব্লিস্টার স্ট্রিপ।

ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ

সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ

тм টেডমার্ক